

-Fitostimoline®

ESTRATTO
ACQUOSO
DI TRITICUM
VULGARE
20% crema vaginale

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Ginecologico

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Fitostimoline® 20 % crema vaginale è indicato per il trattamento delle affezioni flogistiche e distrofiche di qualsiasi natura dei genitali femminili.

Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Precauzioni per l'uso

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea. Altrettanto dicasi in caso di sviluppo di germi insensibili.

Interazioni

Informare il medico o il farmacista se si è recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, anche quelli senza prescrizione medica. Non sono note interazioni od incompatibilità.

Avvertenze speciali

Fitostimoline® 20 % crema vaginale contiene l'alcool cetil stearilico: Può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatite da contatto).

Fitostimoline® 20 % crema vaginale contiene metil para-idrossibenzoato e propil para-idrossibenzoato: Può causare reazioni allergiche (anche ritardate).

Gravidanza ed Allattamento

Fitostimoline® 20 % crema vaginale può essere impiegato senza inconvenienti in corso di gravidanza e di allattamento.

Effetti sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari

Fitostimoline® 20 % crema vaginale non interferisce sulla capacità di guidare e sull'uso delle macchine.

Dose, modo e tempo di somministrazione

1-2 applicazioni al giorno o secondo il parere del medico.

Modalità di applicazione:

- 1) perforare il tubo di crema, utilizzando il perforatore del tappo di chiusura;
- 2) avvitare un applicatore vaginale;
- 3) premere il tubo di crema fino al riempimento totale dell'applicatore;
- 4) svitare l'applicatore dal tubo, introdurlo in vagina e premere lo stantuffo fino al

termine della sua corsa;
5) ogni applicatore va utilizzato una sola volta.

Sovradosaggio

Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Se si ha qualsiasi dubbio sull'uso di Fitostimoline®, rivolgersi al medico o al farmacista.

Effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, Fitostimoline® può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Non sono stati segnalati effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Se uno qualsiasi degli effetti indesiderati si aggrava o se si nota la comparsa di un qualsiasi effetto indesiderato non elencato in questo foglio illustrativo, informare il medico o il farmacista.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedere la data di scadenza riportata sulla confezione.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

I MEDICINALI NON DEVONO ESSERE GETTATI NELL'ACQUA DI SCARICO E NEI RIFIUTI DOMESTICI. CHIEDERE AL FARMACISTA COME ELIMINARE I MEDICINALI CHE NON SI UTILIZZANO PIÙ. QUESTO AIUTERÀ A PROTEGGERE L'AMBIENTE.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA E DALLA VISTA DEI BAMBINI.

COMPOSIZIONE 100 g di crema contengono:

Principio attivo: estratto acquoso di Triticum vulgare (residuo secco pari a 200 mg/100 ml) 20 g.

Eccipienti: 2-fenosietanolo; glicerina; vaselina bianca; sodio cetil stearyl solfato; alcool cetil stearilico; decil oleato; metile para-idrossibenzoato; propile para-idrossibenzoato; acqua depurata.

Forma farmaceutica e contenuto

Crema vaginale.

Tubo di crema da 60 g con 12 applicatori vaginali monouso.

Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e produttore

FARMACEUTICI DAMOR S.p.A.
via E. Scaglione, 27 - 80145 Napoli.

Revisione del foglio illustrativo da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco

Determinazione del 12/10/2010.

© nome depositato

DAMOR
farmaceutici

CV 59703-03