

# -Fitostimoline® idrogel

Con Rigenase® (estratto di grano) e Poliesanide

## Uso topico.

Fitostimoline® idrogel è un dispositivo medico costituito da un gel per uso dermatologico contenuto in un tubo di alluminio.

## INGREDIENTI:

Rigenase® (estratto di grano), Glicerina, Idrossietilcellulosa, Fenossietanolo, Polietilenglicole 400, Poliesanide, Acqua depurata.

## PROPRIETÀ:

Fitostimoline® idrogel, grazie alla sua particolare formulazione (contenente Rigenase®) forma una barriera protettiva contro l'ambiente esterno creando condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione ripielitizzante sulla cute e contribuisce a tenerne sotto controllo il microambiente; pertanto il prodotto è indicato per il trattamento di ulcere, piaghe, ferite, ustioni di primo e secondo grado, scottature, abrasioni. La particolare formulazione in idrogel, grazie all'apporto di acqua dell'87%, favorisce la rimozione del tessuto necrotico attraverso l'autolisi e/o lo sbrigliamento. La presenza di poliesanide ed il pH acido riducono il rischio di contaminazione di funghi e batteri. Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato.

## ISTRUZIONI PER L'USO:

Modalità di applicazione:

Al primo utilizzo forare il tubo mediante il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura. Spalmare quanto occorre di idrogel sulla parte e ricoprire con garza sterile, eventualmente imbibita con lo stesso idrogel. Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con acqua sterile. Le applicazioni, secondo l'entità, estensione ed ubicazione delle manifestazioni, possono ridursi a semplici massaggi di assorbimento. Dopo l'uso richiudere il tubo evitando l'apposito tappo di chiusura. Ripetere l'applicazione ogni 48 ore salvo diversa indicazione del medico.

## EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati

## CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

## OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

## INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

## AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

## MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.

## CONFEZIONI:

Tubo da 50 g

Tubo da 20 g

Tubo da 10 g (Campione gratuito)

Tubo da 5 g (Campione gratuito)

## NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO.



## FABBRICANTE

Farmaceutici Damor, S.p.A.

Via E. Scaglione, 27 - Napoli

Fax: +39 081 7405172 - e-mail: damor@farmadamor.it

® nome depositato

CE 0425

Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: Marzo 2020

## Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo



Leggere attentamente le avvertenze



Limiti della temperatura di conservazione



Tubo in alluminio



Numero di lotto e data di scadenza



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso



Fabbricante



Marchatura di conformità alle direttive della Comunità Europea

CV59800-02

**DAMOR**  
farmaceutici