

-Fitostimoline® PLUS Spray

Con Rigenase® e Poliesanide

Fitostimoline® PLUS Spray è un dispositivo medico per uso dermatologico contenuto in un flacone pressurizzato di alluminio.

INGREDIENTI:

Ogni contenitore sotto pressione contiene: Rigenase®, Poliesanide, Idrossietilcellulosa, Gomma di Guar, Acido citrico, Fenossietanolo, Acqua depurata. Propellente: dimetiletere

INDICAZIONI:

Fitostimoline® PLUS Spray grazie alla sua particolare formulazione a base di Rigenase®, forma una barriera protettiva contro l'ambiente esterno creando condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione ripielizzante sulla cute e contribuisce a tenerne sotto controllo il microambiente. Pertanto, il prodotto è indicato per il trattamento di ulcere, piaghe, ferite, ustioni di primo e secondo grado, scottature, abrasioni.

Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato. La presenza di Poliesanide riduce il rischio di contaminazione batterica.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Modalità di applicazione:

Agitare il contenitore ed erogare direttamente sulla lesione preventivamente detersa; eventualmente ricoprire con garza sterile. La corretta quantità necessaria dipende dall'estensione della lesione da trattare. A seconda dell'estensione della lesione, si consiglia di applicare Fitostimoline® PLUS Spray una o due volte al giorno. Nelle successive medicazioni se necessario, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con acqua sterile. Uso cutaneo.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo accluso.

Pericolo. Aerosol estremamente infiammabile. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione.

Non fumare. Non vaporizzare su fiamma libera o altra fonte di accensione.

Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Proteggere dai raggi solari.

Non esporre a temperature superiori a 50° C.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.

CONFEZIONI:

Flacone da 75 ml e

Flacone da 35 ml e (Campione gratuito)

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO



FABBRICANTE

Farmaceutici Damor S.p.A.

Via E. Scaglione, 27 - Napoli

Fax: +39.081.7405172 - e-mail: damor@farmadamor.it

® nome depositato

CE 0425 DISPOSITIVO MEDICO

Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: Febbraio 2021

Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo.



Fabbricante.



Numero di lotto e data di scadenza.



Marchatura di conformità alle direttive della Comunità Europea.



Estremamente infiammabile.



Limiti della temperatura di conservazione.



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Marchatura di conformità alle direttive europee in materia di aerosol

PAP 22 carta

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verifica le disposizioni del tuo comune

CV60090

106160

DAMOR
farmaceutici